



Как можно обнаружить ВИЧ?

На сегодняшний день самым распространенным способом узнать, инфицирован ли человек ВИЧ, является тест на наличие антител к вирусу иммунодефицита.

Антитела - это специальные белки, которые вырабатываются в организме в ответ на проникновение вируса. Положительный результат теста означает, что у человека обнаружены антитела к ВИЧ. Это дает основание полагать, что человек ВИЧ-инфицирован. Отрицательный результат теста означает, что антитела к ВИЧ не обнаружены.

Клинико-диагностическая
лаборатория
Адрес: г. Выкса, ул. Красные
Зори, здание 16/2

Контактные телефон
+7 (83177) 3-22-55



МБУК ЦБС РПЦПИ



г. Выкса, м-н
Центральный, д.20
второй этаж



+7(83177)6-08-71



www.mrukcbi.ru

МБУК "ЦБС городского округа г. Выкса"
РПЦПИ



Что нужно знать о ВИЧ инфекции

памятка

16+

Выкса
2018

В - ВИРУС И- ИММУНОДЕФИЦИТА Ч - ЧЕЛОВЕКА

ВИЧ-инфекция – это тяжелое инфекционное заболевание с поражением иммунной системы, присоединением вторичных инфекций (туберкулез, пневмония и др.), образованием опухолей и прогрессирующим поражением СПИД-синдром приобретенного иммунодефицита – последняя стадия ВИЧ-инфекции.

Пути передачи ВИЧ-инфекции:

Половой – при половых контактах без презерватива с партнерами ВИЧ-положительного статуса.
Парентеральный – при использовании не продезинфицированных маникюрных инструментов, нестерильных инструментов для татуировки и пирсинга, нестерильных шприцев и игл при внутривенном введении препаратов, переливании инфицированной донорской крови.
Вертикальный – от ВИЧ-положительной женщины к ребенку во время беременности, родов, через грудное молоко.



ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ:

- бытовым путем;
- при рукопожатиях и дружеских поцелуях;
- при укусах насекомых;
- в транспорте;
- в бассейне.

МЕТОДЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВИЧ

- 1 Сохранение верности одномуциальному партнёру и отказ от случайных половых связей.
- 2 Отказ от многочисленных половых связей и от связей со случайными партнёрами
- 3 Использование презервативов при каждом половом акте. Презерватив позволяет снизить риск заражения ВИЧ, инфекциями, передаваемыми половым путём, и незапланированной беременности.
- 4 Отказ от употребления наркотиков
- 5 Использование одноразового инъекционного оборудования
- 6 Обследование на ВИЧ